No. 4 Sur une hernie exomphale

anonyme 1 d

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

un jeune homme de vingt ans eut recours
a moy pour le soulager d'une hernie ombilicale
dans laquelle l'intestin et l'epiploon entroient
souvent ensemble, et quelque fois separement
c'est ce que je jugeay par le recit qu'il me fit
de sa Maladie, et encore mieux par l'examen
que j'eux lieu de faire, non seulement de l'etat
ou il étoit alors, mais encore de tous ceux
dans lequel il se trouva differentes fois pendant
trois années Consecutives, durant lesquelles
il fut obligé d'avoir recours a moy.

Par la declaration qu'il me fit de sa Maladie
il m'apprit que pendant tout le tems qu'il avoit été
a la mamelle, et plusieurs mois apres avoir
été sevré, il avoit toujours été ce que les
nourrisses appellent ~~etre~~ enfant Cruel, C'est a dire

ARC a. 16 d. 4 n° 13 A

dormant peu, criant beaucoup, desirant toujours de teter ou de boire et que deslors il lui parut une grosseur à lombilic, sur laquelle quelqu'un Conseilla de metre une Compresse épesse soutenüe et assujettie, par une bande Circulaire, semblable a mais plus serrée que a Celle dont on se sert a dans les premiers mois a tous les enfans qui sont au maillot Ces precautions furent utiles et elles auroient été éfficasses si elles avoient été Continuées; mais dans un age plus avancé la maladie ne paroissant plus, le bandage fut negligé et lenfant abandonné pour ainsi dire à tous les mouvemens extraordinaires dune bouillante junesse, on vit de tems en tems reparoitre et disparoitre la tumeur ombilicale, le malade se pleignoit de quelque fois de la Colique, et dans un meme jour il avoit du degout

pour les alimens ou mangeoit avec beaucoup
d'apetit, il fut a l'age de neuf ou dix ans
attaqué pour la premiere fois de l'étranglement du boyeau et
il fut si promptement secouru par les saignées et
les remedes topiques qu'au bout de vingt quatre
heures son Chirurgien fit la Reduction
avec beaucoup de facilité; il lui appliqua
un Bandage Convenable mais le Malade
le quitta peu de tems aprés, ne pouvant
se gener, et ne Connoissant pas de quelle
Consequence il etoit de le porter, il aima
mieux s'assujetir a repousser sa tumeur
et la faire rentrer plusieurs fois par
jour toutes les fois qu'il en étoit incomodé
par la douleur de Colique, et de quelque
legere nausée, de metre sa main sur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

l'ombilic dans le tems quil fesoit des efforts
pour aller a la selle, il passa huit ou
neuf ans dans cette gene quil auroit peu
eviter s'il eut peu s'assujettir a l'usage du bandage
qu'on luy avoit toujours proposé et
auquel il navoit peu s'assujettir. a dix neuf
ou vingt ans par un ~~effort~~ Chutte quil fit l'epiplohon
etant deja sorti la tumeur augmenta
Considerablement les efforts quil fit
pour la reduire furent inutiles; il m'apella
a son secours, je reduisis la tumeur mais
quelques instances que je fise je ne pus obtenir
de se servir du bandage, il rentra dans la
sujetion ou il etoit depuis long tems de reduire
~~lui meme~~ plusieurs fois par jour les parties, et
d'eviter toutes sortes d'exercisses pour peu quils
fusent violens